

**Xn****Nocivo**

- Nocivo por ingestión.
- Irrita los ojos y la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar el polvo.
- Usarse industrialmente y guantes de protección adecuados.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO  
(si es posible, muéstrele la etiqueta).

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración, si fuera necesario respiración artificial.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA,

Teléfono 91 562 04 20

#### MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES:

Mamíferos:	A.
Aves:	A.
Peces:	A.
Abejas:	Compatible con abejas.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítase la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

#### GESTIÓN DE ENVASES

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

**CYRO 75 WP****POLVO  
MOJABLE**

## INSECTICIDA SISTÉMICO CONTRA ALGUNOS INSECTOS MINORES DE HOJAS Y CON EFECTO SECUNDARIO CONTRA ARAÑA ROJA

Composición: Círomazina 75% p/p (750 gr/Kg) en forma  
de polvo mojable (WP)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios  
con el nº 23.526/14

USO RESERVADO A AGRICULTORES  
Y APLICADORES PROFESIONALES

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEER BIEN  
LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL  
MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Contenido Neto:

Lote de fabricación:

Titular y fabricante PHOSFONIA, S.L. (Pso. Bonanova, 62, 3ª, Barcelona)

DISTRIBUIDO POR:

*Tratamientos Guadalquivir, S.L.*

*Ctra. de Carmona - Guadalquivir, km. 3.1*

*Apto. de Correos 098*

*4440 Carmona (Sevilla) - España*

*Teléfono: 954 196 230 - Fax: 954 196 240*

**TRAGUSA****CYRO 75 WP****POLVO  
MOJABLE**

#### CARACTERÍSTICAS:

CYRO 75 WP es un insecticida sistémico contra el minador de las hojas (*Lyrimiza* sp.). Posee efecto complementario contra araña roja, en pautas de tres aplicaciones con intervalos semanales, iniciándolas con un ataque de 1 ácaro por hoja. En este caso la dosis será del 0,03% (30 gr/100 l de agua). Interrumpe el ciclo de desarrollo de las larvas impidiendo su paso a pupa y a adulto. Tiene acción de contacto e ingestión, penetra en las hojas y es absorbido también por las raíces, siendo transportado a toda la planta, con efectos inmediatos sobre la plaga. Está indicado en programas de Lucha Integrada (PM), ya que su impacto sobre los depredadores naturales es muy bajo, y es respetuoso con el medio ambiente.

#### APLICACIÓN Y DOSIS AUTORIZADAS:

CULTIVO / ESPECIE	PLAGA / EFECTO	DOSES	P/B
Alicachofa	Lyrimizoma y efecto complementario contra araña roja	0,02-0,04% (20-40 gr/hl)	7
Apio	Lyrimizoma y efecto complementario contra araña roja	0,02-0,04% (20-40 gr/hl)	7
Arbustos ornamentales	Lyrimizoma y efecto complementario contra araña roja	0,02-0,04% (20-40 gr/hl)	NP
Calabacín	Lyrimizoma y efecto complementario contra araña roja	0,02-0,04% (20-40 gr/hl)	3
Lechuga	Lyrimizoma y efecto complementario contra araña roja	0,02-0,04% (20-40 gr/hl)	7
Melón	Lyrimizoma y efecto complementario contra araña roja	0,02-0,04% (20-40 gr/hl)	3
Ornamentales herbáceas	Lyrimizoma y efecto complementario contra araña roja	0,02-0,04% (20-40 gr/hl)	NP
Pepinillo	Lyrimizoma y efecto complementario contra araña roja	0,02-0,04% (20-40 gr/hl)	3
Pepino	Lyrimizoma y efecto complementario contra araña roja	0,02-0,04% (20-40 gr/hl)	3
Sandía	Lyrimizoma y efecto complementario contra araña roja	0,02-0,04% (20-40 gr/hl)	3
Tomate	Lyrimizoma y efecto complementario contra araña roja	0,02-0,04% (20-40 gr/hl)	3

PS.- PLAZO DE SEGURIDAD. Días que han de transcurrir, como mínimo entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con destino a consumo humano o ganadero o a la entrada de ganado.

NP.- NO PROCEDE pp. PS.

#### MODO DE EMPLEO:

En aplicación foliar en pulverización normal: a la dosis del 0,02-0,04% (20-40 gr/100 l de agua), a intervalos semanales, iniciando los tratamientos al observar las primeras picaduras en las hojas del cultivo. En cultivos muy desarrollados, con ataques intensos, y en aplicaciones a intervalos más amplios, usar la dosis del 0,03 al 0,04% (30-40 gr / 100 l de agua).

A través del riego localizado: aplicar 200-500 g por Ha, a intervalos de 1 ó 2 semanas. A partir de la tercera aplicación se obtendrá una persistencia de la acción de 2 a 4 semanas. La realización de una cuarta aplicación dependerá de la duración del cultivo y de la intensidad del ataque.

#### ADVERTENCIAS:

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos ensayos y estudios. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación climatológica, etc...). La empresa garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

